



Características epidemiológicas de pacientes internados con Pie Diabético en el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray.

Ronal Ariel Cantero Ruiz

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero.

Tutoria: Dra. Valeria Yasmin Sande Rolón

26 de Agosto de 2025

Trabajo Final de Grado

Características epidemiológicas de pacientes internados con Pie Diabético en el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray.

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay,

Pedro Juan Caballero, Amambay, Paraguay.

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo describir las características epidemiológicas clínicas y de manejo de pacientes internados por pie diabético en el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, durante el periodo de junio a diciembre de 2024. Se trata de un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo que analizó 25 historias clínicas. La edad media de los pacientes era de 65,64 años con predominio del sexo masculino (64%) y de procedencia rural (56%), todos los pacientes tenían diabetes tipo 2 y el tiempo promedio de diagnóstico de 10,69 años. Había una alta prevalencia de comorbilidades con destaque a la hipertensión arterial sistémica (96%) y obesidad (28%), las infecciones previas estaban presentes en 60% de la población estudiada siendo prevalente la celulitis (24%) y las infecciones respiratorias (16%). Se detectó una queda importante de las cifras glucémicas durante la internación siendo la media de la glucemia del día 0 de internación 223,12mg/dl y del día 15 de internación 123,62mg/dl. El 60% de los pacientes recibió terapia antibiótica combinada y las drogas más utilizadas fueron clindamicina (36%) y ceftriaxona (24%) con una duración media de 9,52 días de antibioticoterapia. La mayoría de los pacientes recibió entre dos o tres curaciones diarias. Las intervenciones quirúrgicas fueron necesarias en 68% de los pacientes con las amputaciones como intervención más realizada. La mayoría de los pacientes (92%) estaba en condición mejorada en el alta. El tiempo promedio de internación fue de 11,66 días.

Palabras clave: Diabetes Mellitus tipo 2. Complicaciones Diabetes Mellitus: Manejo de complicaciones de la Diabetes Mellitus