



**COLECISTECTOMÍAS ABIERTAS EN UN HOSPITAL DE NÍVEL SECUNDARIO PERÍODO
DE 2020-2025**

GUSTAVO MENDES DA COSTA SILVA,
LETÍCIA NASCIMENTO DOS SANTOS FERREIRA,
LUCAS RAFAEL RODRIGUES FERREIRA

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero.

Tutoria: Dr. Sergio Adrián Barreto Román

26 de Agosto de 2025

Trabajo Final de Grado

COLECISTECTOMÍAS ABIERTAS EN UN HOSPITAL DE NÍVEL SECUNDARIO PERÍODO DE 2020-2025

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay,

Pedro Juan Caballero, Amambay, Paraguay.

Resumen

Introducción: La colecistectomía es la extirpación quirúrgica de la vesícula biliar, siendo una de las cirugías mas comunes del aparato digestivo, del 10 al 15% de los pacientes adultos tienen cálculos en la vesícula biliar, entre el 1 y el 4% se vuelven sintomáticos anualmente. El 90-95% de los cuadros de colecistitis aguda esta intimamente relacionado con colelitiasis, desencadenándose inicialmente por la impactación de un cálculo en cuello vesicular o conducto cístico, aunque el mecanismo fisiopatológico no está totalmente establecido. **Objetivo:** Determinar los resultados de las colecistectomías abiertas de los últimos cinco años en un hospital de nivel secundario. **Metodología:** Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo. Fueron incluidos 384 pacientes diagnosticados con litiasis vesicular que realizaran colecistectomía abierta en el Hospital Regional de San Pedro del Ykuamandyju entre 2020 y junio de 2025. Las variables analizadas fueron: edad, sexo, complicaciones pós operatorias, método diagnóstico, presencia de enfermedades de base, tiempo de internación y relación entre la prevalencia de casos en la familia. **Resultados:** de los 384 pacientes colecistectomizados el rango de edad mas frecuente fue de 50 a 59 años, la mayoría del sexo femenino, siendo el principal factor de riesgo el sexo femenino, dolor abdominal como principal manifestacion clinica, recibieron la mayoría omeprazol, profilaxis antibiotica y aines para manejo del dolor, la estancia hospitalaria promedio fue 24 a 48hs.

Palabras clave: Colecistectomía, Vesícula biliar, Calculo biliar.