



**COLECISTITIS EN MUJERES MULTIGESTA ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL
DE CAACUPÉ (DICIEMBRE 2023 -DICIEMBRE 2024)**

Charles Augusto Rodrigues Gomes,
Thays Gabriela Da Silva Reis Brenda de Sousa Araújo,

,

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero.

Tutoria: Dr. Carlos Alberto Soroa Aguirre

26 de Agosto de 2025

Trabajo Final de Grado

COLECISTITIS EN MUJERES MULTIGESTA ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CAACUPÉ (DICIEMBRE 2023 -DICIEMBRE 2024)

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay,

Pedro Juan Caballero, Amambay, Paraguay.

Resumen

La colecistitis constituye una de las patologías quirúrgicas más frecuentes en mujeres adultas, siendo su relación con factores reproductivos y metabólicos de creciente interés clínico. El objetivo general del estudio fue determinar la prevalencia y características clínicas de la colecistitis en mujeres multigestas atendidas en el Hospital Regional de Caacupé durante el período diciembre 2023 a diciembre 2024. Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal con inclusión de 146 mujeres multigestas que cumplieron los criterios de selección establecidos. Las variables analizadas incluyeron edad, número de gestaciones previas, factores de riesgo metabólicos, antecedentes clínicos, cuadro clínico, hallazgos ecográficos, manejo terapéutico y evolución clínica. La información fue recolectada mediante revisión de historias clínicas y registros operatorios, procesándose estadísticamente mediante análisis descriptivo simple. Los resultados mostraron una concentración de casos en mujeres mayores de 40 años, con antecedentes de sobrepeso, obesidad y dislipidemia como factores de riesgo principales. La mayoría de las pacientes presentaron entre dos y cuatro gestaciones previas y un tiempo prolongado desde el último embarazo. El cuadro clínico se caracterizó por la presencia universal de dolor en hipocondrio derecho, con baja incidencia de fiebre o ictericia. Los hallazgos ecográficos fueron homogéneos en toda la muestra, con presencia constante de litiasis vesicular y engrosamiento de la pared vesicular. El tratamiento quirúrgico consistió en colecistectomía abierta bajo anestesia raquídea, con esquema analgésico y antibiótico estandarizado. La evolución clínica fue favorable en todos los casos, con alta hospitalaria al primer día postoperatorio en la mayoría de las pacientes y sin registro de complicaciones postoperatorias. Se concluyó que la colecistitis en mujeres multigestas constituye un cuadro

clínico de presentación típica y homogénea, asociado a factores de riesgo metabólicos y antecedentes obstétricos comunes, siendo el manejo quirúrgico temprano una estrategia segura y eficaz para esta población específica.

Palabras clave: Colecistitis aguda, mujeres multigestas, colecistectomía abierta, factores de riesgo metabólicos, anestesia raquídea.