

UNIVERSIDAD DE LA INTEGRACIÓN DE LAS AMÉRICAS

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD



Licenciatura en Enfermería

Conocimiento del Personal de Enfermería acerca de los Factores que influyen en la Infección Intrahospitalaria. UCIA. Hospital INERAM.

Asunción. Agosto - Noviembre.2017.

Asunción – Paraguay

2017



INTRODUCCIÓN

En la actualidad las Infecciones asociadas a la atención en salud, más comúnmente llamadas Infecciones Intrahospitalarias, son infecciones adquiridas durante la estancia en un hospital y que no estaban presentes ni en período de incubación al momento del ingreso del paciente que afecta a este como consecuencia de su ingreso en el hospital o al personal sanitario como consecuencia de su trabajo, de forma arbitraria, se establece un plazo de cuarenta y ocho a setenta y dos horas como mínimo necesario para considerar la infección como "adquirida en el hospital" (Zaragoza, 2014)

Son consideradas uno de los principales problemas de seguridad del paciente por ser un evento adverso en la mayoría de los casos prevenibles. Al mismo tiempo son consideradas como uno de los mejores indicadores de calidad de la atención debido a su frecuencia, la gravedad que conllevan, el aumento significativo de los costos que implica su ocurrencia y porque reflejan el resultado de acciones del equipo de salud, susceptibles de ser modificadas de acuerdo a los estándares vigentes (Zaragoza, 2014)

Las infecciones intrahospitalarias son un problema actual y en constante evolución en todo el mundo y afectan por igual a pacientes de países desarrollados y a los de menos recursos. Estas infecciones están entre las principales causas de defunción y de aumento de la morbilidad de los pacientes hospitalizados, y son una pesada carga económica, social y sanitaria tanto para el paciente como para el sistema de salud. Entre las infecciones hospitalarias más frecuentes se encuentran la infección de vía urinaria, infección vía respiratoria, infecciones de sitio quirúrgico, y la infecciones del torrente sanguíneo. Su prevalencia varía en los diferentes servicios de los hospitales, aunque son más frecuentes en los de terapia intensiva, neonatología y cirugía. Las repercusiones de las infecciones intrahospitalarias en los costos de la atención están plenamente demostradas. Así mismo, se ha determinado que entre los factores de riesgo están, al margen de la gravedad de la enfermedad de base del paciente y de los factores intrínsecos e extrínsecos como su grado de nutrición e inmunidad, la edad avanzada, el tiempo de estancia del paciente en el hospital y el mayor número de procedimientos terapéuticos y diagnósticos invasores. (Zaragoza, 2014)