



Consecuencias cardiovasculares de eventos coronarios agudos en pacientes internados en servicio de clínica medica y terapia intensiva del Hospital Regional de Concepción en al año 2023

Autor Anna Maria Ferreira Mariano

Sarah Sariny Gobbo Chalub

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero

29 de enero de 2025

Trabajo Final de Grado



Resumen

La enfermedad coronaria es la principal causa de muerte e incapacidad en los países desarrollados. Según la organización Mundial de la Salud, América Latina se enfrenta a una epidemia creciente , explicada , entre otras razones, por la transición epidemiológica y la alta prevalencia de reconocidos factores de riesgo para la enfermedad coronaria como la dislipidemia y la diabetes mellitus . Según datos proporcionados por el programa nacional de Prevención Cardiovascular del Ministerio de Salud, esta enfermedad es la primera causa de muertes en hombres y mujeres. Es por ella que se realiza una investigación bajo un enfoque cuantitativo , de diseño observacional , descriptivo , retrospectivo y de corte transversal , con el objetivo de identificar las consecuencias cardiovasculares de eventos coronarios agudos en pacientes internados en servicio de clínicas Medicas y terapia Intensiva del Hospital Regional de Concepción en el periodo de enero a diciembre 2023. Los resultados revelaron que los pacientes mas afectados por eventos coronarios agudos fueron hombres de la zona urbana , mayores de 50 años, con antecedentes de HTA, en quienes el motivo principal de ingreso fueron síntomas vasovagales como náuseas y vómitos. . El resultado electrocardiográfico mas relevante fue que casi la mitad de los pacientes presento Supradesnivel del Segmento ST. Las complicaciones cardiacas mas frecuentes de los pacientes fueron la Arritmia, La Fibrilación Auricular con Respuesta Ventricular Alta (FARVA), bloqueo de rama y taquicardia ventricular. El 34% de los mismos requirió ingreso a unidad de terapia intensiva y el 20% fue trasladado a centros de mayor complejidad para cateterismo. La tasa de mortandad fue del 15% para pacientes ingresados a UTI y del 19% para pacientes internados en sala

Palabra clave: Síndrome coronario agudo , Infarto agudo de miocardio, Factores de riesgo

