



CORRELACIÓN ENTRE MORTALIDAD Y TABAQUISMO EN MUJERES CON CÁNCER DE MAMA

Alexandre Lins Moura, Bruno Damiani Crestani, Henrique Damiani Crestani

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero

Tutoría Dr. Carlos Alberto Soroa Izaguirre

02 de Febrero de 2024

Trabajo Final de Grado

Resumen

El cáncer de mama es una neoplasia compleja, con alta heterogeneidad clínica, morfológica y biológica, con diferentes respuestas terapéuticas. Aunque se considera que tiene un buen pronóstico cuando se detecta a tiempo, este tumor maligno sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer entre las mujeres en todo el mundo. Este estudio tendrá como objetivo un análisis crítico de investigaciones publicadas previamente en revistas indexadas en las bases de datos PubMed, Medline y Scielo sobre el tema abordado. Se sabe que fumar aumenta el riesgo de muchos problemas de salud, incluido el cáncer. La asociación entre el tabaquismo y el riesgo de cáncer de mama se ha evaluado ampliamente en estudios epidemiológicos, pero los resultados discrepantes se han atribuido a la variación en los métodos de evaluación de la exposición al humo del tabaco. Entre los componentes químicos identificados en los cigarrillos, se encuentran aquellos que son considerados cancerígenos y actualmente se sabe que muchos de estos cancerígenos reaccionan con el ADN, dando como resultado a ductos, que provocan alteraciones genéticas. Además, esta enfermedad tiene una evolución variable, debido a las diferentes formas moleculares existentes. Por lo tanto, esta revisión de la literatura reporta el tabaquismo como un factor ambiental, estudiado a lo largo de los años, que puede ser reconocido como un agente cancerígeno con evidencia de riesgo y empeoramiento de la respuesta terapéutica del cáncer de mama, lo que conduce a una mayor mortalidad durante el tratamiento, en relación con un paciente que nunca había sido fumador.

Palabras clave: Cáncer de mama, factores de riesgo, conocimiento.