



Deteccion del EGB y profilaxis intraparto como factor de prevención de la Sepsis Neonatal

Autor Amanda Ascencio da Silva

Suellen Santos Cardoso

Thaina Jessica da Costa Rodrigues

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero

20 de agosto de 2024

Trabajo Final de Grado



Resumen

El Streptococcus del grupo B (SGB) es una bacteria gran positiva presente en la microbiota gastrointestinal inferior y tracto genital femenino. Es una de las causas de transmisión vertical mas frecuente en neonatos y como consecuencia el principal microorganismo causador de sepsis neonatal. Se hace necesario la antibioticoterapia intraparto en los casos de embarazadas con cultivo positivo, a fin de prevenir la sepsis neonatal. Objetivo: Determinar la relación de la detección del EGB y de profilaxis intraparto como factor de prevención de la sepsis neonatal. Metodología: Revision sistematica , con análisis en mujeres embarazadas en el periodo de 35 e 37^a semanas de gestación , donde se anlizan artículos de los últimos 13 años que abordan sobre las dos variables establecidas: Profilaxis del EGB y la prevención de la sepsis neonatal , con exclusión de artículos que abordan otras patologías no relacionadas al Estreptococo beta-hemolitico del grupo B mediante la correlación de datos, selección y análisis de artículos científicos. Los resultados obtenidos en el presente trabajo demuestran que la profilaxis intraparto con antibioticoterapia ha reducido el riesgo de óbito por sepsis neonatal. Se concluye que la profilaxis intraparto tiene relevancia en la prevención de la enfermedad neonatal precoz. Se recomienda que las embarazadas realicen el rastreo mediante la cultura en el pre natal a fin de prevenir las complicaciones maternos/fetales.

Palabra clave: Streptococcus agalactiae, Embarazo , Profilaxis intraparto, Sepsis neonatal