



**UNIVERSIDAD DE LA INTEGRACIÓN DE LAS
AMÉRICAS**

FACULTAD DE SALUD

**LICENCIATURA EN KINESIOLOGÍA Y
FISIOTERAPIA**

**EFFECTOS DE LA RADIOFRECUENCIA SOBRE LA
FLACIDEZ ABDOMINAL EN MADRES NO LACTANTES (25-
40 AÑOS) DURANTE EL POSPARTO TARDÍO, ATENDIDAS
EN UNA CLÍNICA DE FERNANDO DE LA MORA ENTRE
ABRIL Y JUNIO DEL 2025.**

Evelyn Nicole Gonzalez Delgado

Asunción, Paraguay

Año 2025



RESUMEN

Introducción: La flacidez abdominal en el posparto tardío es una de las alteraciones estéticas más frecuentes, derivada de los cambios fisiológicos y estructurales que afectan piel y musculatura abdominal. Esta condición genera preocupación estética y funcional, impulsando la búsqueda de alternativas no invasivas que favorezcan la recuperación del tono y la firmeza cutánea. Entre estas, la radiofrecuencia se ha posicionado como un tratamiento seguro y eficaz; sin embargo, la evidencia científica en madres no lactantes sigue siendo limitada, justificando estudios focalizados en esta población.

Objetivo general: Analizar los efectos de la radiofrecuencia sobre la flacidez abdominal en madres no lactantes de 25 a 40 años en etapa de posparto tardío, atendidas en una clínica especializada de Fernando de la Mora entre abril y junio de 2025.

Método: Se realizó un estudio cuasi-experimental, descriptivo y longitudinal con 15 participantes. No se contó con grupo control ni se aplicó aleatorización; la intervención se administró directamente y los resultados se evaluaron mediante mediciones clínicas objetivas antes y después del tratamiento, complementadas con encuestas estructuradas sobre percepción de cambios, satisfacción y posibles reacciones adversas.

