



**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL PARAGUAY - UCP
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

CARRERA DE MEDICINA

**EMBARAZO ECTOPICO
LA IMPORTANCIA DE UN DIAGNOSTICO PRECOZ**

AUTORES

Lethícia Thuanny Santos Leite Paiva

Letícia Maria Basso de Lima

TUTORA

Dra. Talita Silva Miyamoto

Pedro Juan Caballero – Paraguay
Año 2022

1. RESUMEN

Se define embarazo ectópico como la implantación y desarrollo del blastocito en cualquier lugar que no sea cavidad endometrial. La trompa de Falopio es el lugar más común de implantación, siendo responsable por 95% de los embarazos ectópicos. Su frecuencia experimentó un incremento en los últimos 20 años en Paraguay (1). El diagnóstico precoz del embarazo ectópico se basa en el prenatal, la historia clínica, medición de la beta-gonadotropina coriónica humana (β -HCG) cuantificado y los hallazgos de la ecografía transvaginal. El objetivo es, traer la importancia del diagnóstico precoz de tal patología, mostrando que cuando es diagnosticado precozmente logramos reducir la morbilidad materna, con el fin de elegir un tratamiento ideal y oportuno, con enfoque en la fisiopatología de la enfermedad. Materiales y métodos: estudio descriptivo retrospectivo, basado en observación de resolución clínica y seguimiento de tratamiento de pacientes que consultaran en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital General de San Pedro Paraguay-Corea y Urgencias Ginecobstetricia de tal hospital, trayendo en conjunto revisiones bibliográficas, que hace base al trabajo. Fueron estudiadas: la prevalencia de tal patología, edad media del diagnóstico, motivo de consulta, los métodos diagnósticos utilizados para su diagnóstico, la edad gestacional del diagnóstico, la resolución de los casos conforme diagnóstico precoz o tardío de las pacientes. Resultados: la prevalencia de embarazos ectópicos hallada fue 1,47%. La edad media fue 29 ± 5 años. El motivo más frecuente de consulta en la urgencia del servicio de ginecoobstetricia fue dolor abdominal en andar inferior, con escaso sangrado. el método de diagnóstico más utilizado fue la clínica y ecografía transvaginal de emergencia, aunque durante el estudio de casos ninguno fue diagnosticado de forma precoz. La edad gestacional promedio al momento da consulta fue $6,5 \pm 1,8$ semanas. Se observó que la laparotomía de emergencia fue mucho más realizada.

PALABRAS CLAVES: Embarazo ectópico, diagnóstico precoz, prenatal, mortalidad materna, β -HCG, Ecografía transvaginal, tratamiento farmacológico