



**Estudio epidemiológico de pacientes operados de apendicitis aguda en hospital
Distrital de Ñemby: de Julio a diciembre de 2024**

Autor Lilian Cristina da Silva

Natalia Kellen de Araujo Sousa

Odiar José Mariano

**Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan
Caballero**

29 de enero de 2025

Trabajo Final de Grado



Resumen

Se realizó un estudio epidemiológico, descriptivo y transversal con el objetivo de describir el perfil de los pacientes operados de apendicitis aguda en el hospital Distrital de Ñemby entre julio y diciembre de 2024, así como identificar los síntomas, signos clínicos y hallazgos quirúrgicos más frecuentes. Se incluyeron 68 pacientes con diagnóstico confirmado de apendicitis aguda, sometidos a apendicectomía y con registros clínicos completos. Las variables analizadas incluyeron características demográficas, síntomas clínicos como dolor abdominal, náuseas y vómitos, hallazgos quirúrgicos como apéndice flemonoso y gangrenoso, y exámenes complementarios. Los resultados mostraron una predominancia masculina (66,18%) y un mayor número de casos de pacientes de 20 a 39 años (55,88%). El dolor abdominal fue un síntoma universal (100%), seguido de náuseas (89,71%) y vómitos (86,76%), mientras que el signo de Blumberg fue el más prevalente (70,59%). La apendicitis flemonosa fue el hallazgo quirúrgico más común (61,76%), aunque un porcentaje significativo de casos avanzados indicó retrasos en la búsqueda de atención. Se concluyó que el diagnóstico temprano y la intervención oportuna son esenciales para prevenir complicaciones, destacando la necesidad de mejorar el acceso a la atención sanitaria y la documentación clínica.

Palabra clave: Apendicitis aguda, Epidemiología, Signos clínicos, Procedimientos quirúrgicos, Salud Pública