



**EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES ONCOLÓGICOS CON LA
APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO FACT-G**

**Eline Thaliany Dos Santos De Lima,
Tony Lúcio Lafuente Pacheco,
Welisney Andrade Silva**

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero.

Tutoria: Dra. Valeria Yasmin Sande

26 de Agosto de 2025

Trabajo Final de Grado

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES ONCOLÓGICOS CON LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO FACT-G

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay,

Pedro Juan Caballero, Amambay, Paraguay.

Resumen

La calidad de vida en pacientes oncológicos internados constituye un componente esencial para comprender el impacto global de la enfermedad y su tratamiento. El objetivo del estudio fue evaluar la calidad de vida de pacientes oncológicos hospitalizados en el Hospital Nacional de Itaugua, entre marzo y junio del año 2025, utilizando el cuestionario FACT-G como instrumento de medición. Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal, con una muestra de 57 pacientes adultos. Se aplicó el cuestionario FACT-G, que mide bienestar físico, emocional, social/familiar y funcional. Se analizaron variables clínicas (estadio, tipo de tratamiento, respuesta), sociodemográficas (edad, sexo, residencia, apoyo familiar) y de estilo de vida. El puntaje promedio total del FACT-G fue de 43.7 sobre 80 (54.6%), lo que reflejó una calidad de vida global moderada. El bienestar físico obtuvo 13.3/28 (47.5%), el bienestar emocional 12.7/24 (52.9%) y el bienestar social/familiar 17.6/28 (62.9%), siendo esta última la dimensión mejor conservada. El 42.1% de los pacientes se ubicó en el nivel medio de calidad de vida global, seguido por 31.6% en nivel bajo y 26.3% en nivel alto. Se halló una relación estadísticamente significativa entre el estadio clínico y la calidad de vida ($p < 0.05$). con puntajes promedio descendentes estadio I (50.2), estadio II (43.8), estadio III (40.3) y estadio IV (36.3). No se encontraron diferencias significativas en calidad de vida según sexo ni tipo de tratamiento ($p > 0.05$). El 70.2% reportó apoyo emocional exclusivo de la familia, mientras que 91.2% no realizaba actividad física regular y 75.4% presentaba comorbilidades. Se concluyó que el estadio clínico fue el principal factor asociado negativamente con la calidad de vida, y que el soporte familiar resultó un componente clave de contención durante la hospitalización.

Palabras clave: Neoplasias, Calidad de Vida, FACT-G, Pacientes Hospitalizados, Cuestionarios