



Factores asociados a la ictericia neonatal y su tratamiento

Beatriz Pereira Goes, Gabriela Novais Pereira, Josely Leite Da Silva Pereira
Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan
Caballero

Tutoria: Dr. Sebastião Marcos Rigonato da Silva

12 de Julio de 2023

Trabajo Final de Grado

Factores asociados a la ictericia neonatal y su tratamiento¹

Factors associated with neonatal jaundice and its management.

Beatriz Pereira Goes, Gabriela Novais Pereira, Josely Leite Da Silva Pereira², Dr. Marcos

Sebastião Rigonato da Silva³

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay,

Pedro Juan Caballero, Amambay, Paraguay

Resumen

La ictericia neonatal es una enfermedad común, caracteriza por la coloración amarillenta de la piel y partes blancas de los ojos. que se identifica a partir de exámenes físicos y de laboratorio del recién nacido, es decir, en bebés de 0 a 28 días, siendo fundamental la detección precoz, preferentemente dentro de las primeras 24 horas de vida, y el monitoreo continuo del recién nacido. Esta enfermedad puede ser causada por la inmadurez del hígado del bebé, pero, hay otras etiologías asociadas, como la desencadenada por la lactancia, incompatibilidad sanguínea y enfermedades hepáticas, por esto, su diagnóstico y tratamiento adecuado es esencial, ya que los portadores de esta enfermedad pueden evolucionar a una condición más grave llamada Kernicterus. Por lo tanto, el presente estudio pretenderá realizar una revisión de literatura, a partir de pesquisa bibliográfica en bases de datos, Biblioteca Virtual en Salud (BVS), Scientific Electronic Library Online (Scielo), MEDLINE/PubMED con artículos de los 5 últimos años, por medio de una búsqueda en la literatura científica sobre los factores relacionados con la ictericia neonatal, abordando sus causas y métodos de tratamiento, con el fin de aumentar los datos sobre la enfermedad, discutir su manejo adecuado y así evitar complicaciones a los pacientes afectados. En resumen, el diagnóstico precoz de la ictericia neonatal es esencial para un tratamiento oportuno y los factores de riesgo de ictericia neonatal involucran el nacimiento prematuro o tardío, el bajo peso al nacer, la lactancia materna inadecuada, la

¹ Artículo científico presentado como Trabajo Final de Grado a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central del Paraguay – Filial Pedro Juan Caballero, para la obtención del título de Médico.

² Autores. Estudiantes de la carrera de Medicina. Correo electrónico: gabrielanovars@gmail.com

³ Docente tutor. Médico Marcos Sebastião Rigonato

incompatibilidad sanguínea madre-hijo y los antecedentes familiares de infecciones, además de algunos medicamentos también pueden aumentar el riesgo de ictericia neonatal y por ello la importancia del diagnóstico en las primeras 48 horas de vida del bebé.

Palabras clave: Ictericia, Neonatal, Kernicterus, Hiperbilirrubinemia Neonatal.