



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL PARAGUAY – UCP

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

CARRERA DE MEDICINA

**“FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS CON LAS
COMPLICACIONES DE LA APENDICITIS AGUDA (AA)”**

Trabajo de Grado Final para optar por el título de Médico.

AUTORES

**Dara Staut Rodrigues
Osvaldo Ernesto Rodriguez Olazar**

TUTOR

Dr. Juan Carlos Armoa

Pedro Juan Caballero – Paraguay

Año 2022

1. Resumen

La apendicitis aguda es una de las patologías más frecuentes que ha afectado al ser humano. De hecho, se estima que alrededor del 8% de la población mundial es operados durante toda la vida por esta patología. Es la urgencia abdominal más frecuente, con una incidencia en Europa y Estados Unidos de aproximadamente 100 casos por 100.000 habitantes/año, afectando a ambos sexos de forma similar. META: informar las principales complicaciones postoperatorias relacionadas con la apendicectomía. METODOLOGÍA: para la investigación se utilizaron las siguientes bibliotecas virtuales: Biblioteca Virtual en Salud (BVS), a través de la base de datos Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (Lilacs); la Biblioteca Científica Electrónica En línea (SciELO) y PubMed. La búsqueda se realizó en enero de 2022, utilizando el siguientes Descriptores de Ciencias de la Salud (DeCS): Apendicectomía, Apéndice, Complicaciones, RESULTADOS: Las principales complicaciones fueron: absceso (12,65%), fístula enterocutánea (2,53%), neumonía (1,65%), obstrucción del tracto intestinal (1,65%), sepsis (1,65%), además de farmacodermia, infección urinaria y hipoglucemia DISCUSIÓN: Las complicaciones locales más frecuentes reportadas en literatura son absceso de pared, absceso residual, obstrucción intestinal, fístula heces, evisceración, eventración, peritonitis y hemorragia. Otras complicaciones generales comunes a cualquier celiotomía son respiratorias, urinarios, cardíacos, hematomas, hemorragias subcutáneas e infecciones hospitalarias, en general, flebotrombosis y tromboflebitis séptica. La apendicectomía laparoscópica (AL) no está asociada con una menor tasa de complicaciones que la apendicectomía abierta (AA) y sobre todo las AL son más caros que AA. CONCLUSIÓN: Creemos que la identificación temprana favorecería la prevención secundaria de las complicaciones y la reducción de su morbilidad. Sin embargo, la apendicectomía laparoscópica por apendicitis perforada se asoció con una tendencia importante hacia una mayor tasa de formación de abscesos intraabdominales, siendo esta la principal complicación de una apendicectomía.

Palabras clave: Apendicectomía, Apéndice, Complicaciones,