



Factores de riesgo en la gestación con Preeclampsia : Una revision Bibliográfica

Autor: Bruno Vicente Quessada

Gabriel Cassorielo Couti

Ivanilda Ferreira Santana

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero

20 de agosto de 2024

Trabajo Final de Grado



Resumen

El presente estudio tuvo como objetivo Analizar los principales factores de riesgo asociados con el desarrollo de preeclampsia durante la gestación a través de una revisión sistematica. Para ello, se realizo una revisión sistematica de la literatura científica disponible en las bases de datos MEDLINE, EMBASE y LILACS. Se incluyeron estudios Observacionales y revisiones sistemáticas publicados en los últimos 10 años . Se recopilaron datos sobre variables , factores de riesgo relacionados a la preeclampsia . Los hallazgos mas destacados de esta revisión indicaron que la edad materna avanzada el sobrepeso u obesidad pregestacional , la nuliparidad y los antecedentes familiares de preeclampsia fueron los principales factores de riesgos identificados . Además se observo que las mujeres con diabetes pregestacional o gestacional presentaron un mayor riesgo de desarrollar preeclampsia en comparación con las mujeres sin estas condiciones . Otros factores de riesgo significativamente asociados fueron la infección del tracto urinario , trastorno tiroideos, el síndrome del ovario poliquístico y la historia previa de preeclampsia . Esta revisión bibliográfica permitió identificar diversos factores de riesgo , tanto modificables como no modificables , que se asocian de manera importante con la preeclampsia durante la gestación. Estos hallazgos resaltan la importancia de realizar una evaluación integral del riesgo de preeclampsia en las mujeres embarazadas. De esta manera, se podrá contribuir a la detección temprana y al manejo oportuno de esta complicación , lo cual es fundamental para mejorar los resultados materno-fetales.

Palabra Clave: Hipertension arterial, Embarazo, Preeclampsia