



Factores que predisponen parto prematuro , servicio de neonatología en el Hospital Regional de Concepcion, 2023

Autor: Vinicius de Sousa Simões

Danilo Balotari Rodrigues

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero

20 de agosto de 2024

Trabajo Final de Grado



Resumen

El tema de investigación se denomina Perfil clínico y epidemiológico del parto prematuro del servicio de Neonatología, Hospital Regional de Concepción, 2023. Se plantea como objetivo del estudio, describir el perfil clínico y epidemiológico del parto prematuro del servicio de Neonatología, Hospital Regional de Concepción, durante el año 2023, a través de un estudio de enfoque cualitativo, retrospectivo, de diseño no experimental, con el propósito de conocer a través de un análisis documental, el contexto de las 53 gestantes que debe sobrellevar un nacimiento prematuro, tomar como eje los factores que desencadenan el trabajo de parto pretermino, los datos sociodemográficos, las causas clínico obstétricas y las consecuencias del parto prematuro. Los resultados fueron que, en lo que respecta a los datos sociodemográficos de las mujeres, se registraron que, en su mayoría oscilan entre 24 a 28 años, de procedencia de Concepción y en su mayoría se determinaron que se encuentran entre 35 y 37 semanas. En cuanto a los factores clínicos obstétricos un grupo ha sufrido preeclampsia severa y otro grupo de hipertensión arterial, teniendo una prematuridad de grado moderado y leve. Las gestantes han registrado que han tenido parto vaginal y otro grupo registraron por cesarea programada. Respecto a las consecuencias del nacimiento prematuro en el recién nacido, la mayoría no habrían tenido ninguna consecuencia, pero un grupo sufrieron insuficiencia respiratoria y otro grupo han tenido bajo peso. Se concluye que en cuanto al perfil clínico y epidemiológico del parto prematuro del servicio neonatología, Hospital Regional de Concepción, las gestantes poseen entre 24 a 28 años de edad, cuya procedencia son de la ciudad de Concepción, siendo las causas más determinantes la preeclampsia e hipertensión y como consecuencia se señala insuficiencia cardíaca y peso bajo de los neonatos, con prematuridad moderada.

Palabra Clave: Parto prematuro, Factores predominantes, Neonatología, Madre