



**Frecuencia de la Enfermedad de Hansen en el Hospital Nacional de Itauguá, Periodo
2021-2023**

Priscila Leiko Turuda, Rafael Almeida Pinto, Maria Eduarda da Silva

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero

Tutoría: Sergio Barreto

02 de febrero de 2024

Trabajo Final de Grado

Resumen

Introducción: La lepra es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria *Mycobacterium leprae*, también conocida como bacilo de Hansen. El bacilo se reproduce muy despacio y el periodo promedio de incubación e inicio de los signos y síntomas de la enfermedad es de aproximadamente cinco años. **Objetivos:** Determinar la frecuencia de enfermedad de Hansen en el Hospital Nacional de Itauguá, periodo 2021-2023. **Metodología:** Estudio observacional Descriptivo retrospectivo. Se recopilarán los datos clínicos del paciente que han sido diagnosticado con Enfermedad de Hansen y que ha sido tratados en el Hospital Nacional de Itauguá. Se utilizará una evaluación estructurada de las fichas de internación, para recopilar datos sobre los síntomas presentados, la duración de los síntomas, los tratamientos recibidos y los resultados del tratamiento. Todos los datos serán analizados de manera sistemática y se utilizarán evidencias descriptivas para presentar los hallazgos. **Resultado:** En el estudio realizado sobre la Enfermedad de Hansen desde el 2021 a 2023

encontramos 46 casos, la mayor parte de ellos fueron del sexo masculino alcanzando 61%, el rango de edad más frecuente en 28% de los casos es de 31 a 40 años, el 52% de ellos son casados, la ocupación más afectada fue en 24% QHD. Según la clasificación de la OMS en el 42 (91%) fueron multibacilares, las regiones del cuerpo más afectada fueron Miembros superiores (83%) y tronco 37(80%), ya la clasificación de Madrid encontramos que en el 33% fueron Dimorfa/Virchowiana. Cuanto al criterio diagnostico prevalece el diagnóstico clínico con 85%. Todos los 46 pacientes recibieron lo tratamiento PQT, de los cuales 91% multibacilares por 12 meses y 4 9% paucibacilares por 6 meses.

Palabras clave: Hanseniasis, Diagnóstico, Tratamiento.