



Gangrena de Fournier en una mujer joven, relato de caso desde Hospital Regional de Caacupé-PY.

Adrielly Almeida Parente

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan
Caballero

Tutoria: Dr. Sebastião Marcos Rigonato da Silva

02 de Febrero de 2024

Trabajo Final de Grado

Gangrena de Fournier en una mujer joven, relato de caso desde Hospital Regional de Caacupé-PY.¹

Fournier's Gangrene in a young woman: Case report from the Hospital Regional de Caacupé-PY. ¹

Adrielly Almeida Parente², Dr. Sebastião Marcos Rigonato da Silva³.

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay,

Pedro Juan Caballero, Amambay, Paraguay

Resumen

La Gangrena de Fournier representa una variante de la fascitis necrotizante, esta afección altamente letal que afecta las zonas perianales, perineales y genitales fue descrita por el dermatólogo francés Jean Alfred Fournier en 1883, a partir de 5 casos de pacientes con gangrena del pene y escroto de etiología idiopática. En sus informes delineó tres características fundamentales de esta afección; inicio abrupto en hombres jóvenes y saludables, progresión rápida y ausencia de un agente causante específico. Se trata de una enfermedad infecciosa con una tasa de mortalidad de hasta 40%, siendo más común en hombres alrededor de la quinta década de vida. El diagnóstico temprano es crucial para un tratamiento adecuado. Se presenta el caso de una paciente femenina de 27 años diagnosticada con Síndrome de Fournier, quien fue sometida a desbridamiento y colostomía en el Hospital General de Caacupé. La paciente experimentó una buena evolución debido a las intervenciones y al tratamiento rápido y preciso. Los informes muestran una buena respuesta a los tratamientos propuestos y una adecuada adherencia a las pautas adoptadas por el equipo médico. Se subraya la necesidad de un seguimiento diario de la evolución para la prevención de

complicaciones y la aplicación de intervenciones tempranas, factores cruciales para la toma de decisiones adecuadas y una perspectiva positiva en la mejora del caso.

Palabras clave: Gangrena de Fournier, casos, clínico, diagnóstico