



Hanseniasis con reacción tipo2: Abordaje clínico y terapeutico en un paciente privado de libertad-Reporte de caso

Autor Claudete Aparecida Rodrigues da Silva

Francisca Mabel Meza Nuñez

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero

28y 29 de enero de 2025

Trabajo Final de Grado



Resumen

La hanseniasis causada por *Mycobacterium leprae*, sigue siendo un desafío de salud pública, especialmente en contextos de privación de libertad, donde factores como acceso limitado a la atención médica, condiciones higiénicas deficientes y barreras socioculturales afectan el manejo adecuado de la enfermedad. Este estudio tuvo como objetivo describir el abordaje clínico y terapéutico de un paciente masculino de 23 años, privado de su libertad, con hanseniasis multibacilar y reacción tipo 2. Se trató de un reporte de caso con enfoque observacional y retrospectivo, realizado en un hospital regional de Pedro Juan Caballero, Paraguay. El paciente presentó fiebre persistente, lesiones cutáneas inflamatorias y compromiso sistémico. Fue ingresado en la unidad de terapia intensiva Aduto (UTIA), durante nueve días, donde recibió tratamiento con Talidomida, Clorofazimina, Prednisona y antibióticos de amplio espectro, logrando estabilización hemodinámica y mejoría progresiva de los síntomas. Se identificaron barreras significativas para el tratamiento debido a su condición de privación de libertad, incluyendo limitaciones en la continuidad del cuidado y estigmatización social. Los resultados evidenciaron que una intervención terapéutica temprana y un manejo multidisciplinario pueden controlar efectivamente las reacciones tipo 2, reducir la inflamación sistémica y prevenir complicaciones mayores, se concluye que es fundamental implementar programas de seguimiento adaptados a esta población vulnerable, con énfasis en la educación sanitaria, la prevención de recaídas y la capacitación del personal sanitario.

Palabras clave: Hanseniasis, Reacción tipo 2, Terapia farmacológica