



Hemorragia puerperal relacionada con Atonía Uterina en el Hospital General de San Lorenzo en el Primer Semestre de 2023

Divina Maria Corrêa Barbosa, Maria Gessica dos Reis Cavalcante, Raquel da Silva Cañete.

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero

Tutoría: Wenceslao Gómez López

02 de febrero de 2024

Trabajo Final de Grado

Hemorragia puerperal relacionada con Atonía Uterina en el Hospital General de San Lorenzo en el Primer Semestre de 2023¹

Puerperal hemorrhage related to uterine atony at the San Lorenzo General Hospital in the first half of 2023

Divina Maria Corrêa Barbosa, Maria Gessica dos Reis Cavalcante, Raquel da Silva Cañete²,
Wenceslao Gómez López³

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay,

Pedro Juan Caballero, Amambay, Paraguay

Resumen

La hemorragia puerperal es una de las complicaciones más preocupantes del cuarto período del trabajo de parto, que tiene como una de las principales causas la atonía uterina, que es la pérdida del tono muscular del útero logo después del alumbramiento. Este trabajo tiene el objetivo de Identificar los casos de hemorragia puerperal relacionado con atonía uterina en el Hospital General de San Lorenzo (HGSL), en el primer semestre de 2023. Se realizó un estudio cuanti-cualitativo, observacional retrospectivo, descriptivo, de nivel exploratorio, teniendo como población y muestra pacientes de la obstetricia en el HGSL, que tuvieron parto natural y cesariana, siendo analizados 400 fichas médicas. Como resultado final, verificase que 4% de las investigadas tuvieron hemorragia puerperal (HPP) y de estas 86% la causa fue la atonía uterina. En el HGSL, el factor de riesgo principal para la atonía uterina es la fatiga muscular con 57% de los casos, por multiparidad en 43% de las investigadas. Todas las parturientes reciben profilaxis con oxitocina y cuando ocurre la HPP se sigue el protocolo de la OMS con uso de uterotónicos antes de someter la mujer a procedimientos quirúrgicos. Todas las pacientes tuvieron su hemorragia controlada, 96% sin secuelas y 3% tuvieron como consecuencia la infertilidad y 1% sufrieron insuficiencia Renal/hepática y síndrome del Distrés Respiratorio Agudo. En los meses de la investigación no hubo muerte materna por HPP.

Palabras clave: Atonía uterina, Hemorragia Posparto, Complicaciones, Tratamiento.