



Impacto del uso de Penicilina en Gestantes VDRL positivo: Revisión de Literatura

Alexander Jatiniel Rodrigues dos Santos, Cleuza Claus de Proença

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero

Tutoría: Dra. Sady Pamela Fernandez Ramirez

2 de febrero de 2024

Trabajo Final de Grado

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad
Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero,
Amambay, Paraguay

Resumen

La sífilis es una infección bacteriana sistémica causada por *Treponema pallidum*, una bacteria Gram negativa del grupo de las espiroquetas. Sus manifestaciones clínicas son variables y ocurren de acuerdo con el tiempo de evolución de la enfermedad, variando en sus subtipos: sífilis primaria, secundaria, latente y terciaria. Su transmisión es predominantemente sexual y durante el embarazo puede infectar al feto por vía transplacentaria, lo que puede causar muerte fetal, parto prematuro, bajo peso al nacer, malformaciones congénitas, sífilis congénita activa en el neonato, así como secuelas a largo plazo. En Paraguay, la incidencia de sífilis es una de las más altas de América Latina y, por lo tanto, la promoción de la salud, la prevención y las medidas de manejo adecuadas son indispensables para evitar daños futuros. Por lo tanto, el presente estudio tiene como objetivo conocer y abordar eficazmente el impacto del uso de penicilina en gestantes VDRL positivas, a través de una revisión bibliográfica, con el fin de reducir su incidencia y consecuencias negativas para la salud materna y neonatal.

Palabras clave: Sífilis en el embarazo, Sífilis congénita, Incidencia, Atención primaria, Atención prenatal