



UNIVERSIDAD CENTRAL
DEL PARAGUAY

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL PARAGUAY

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

CARRERA DE MEDICINA

**LA IMPORTANCIA DEL PRENATAL PARA LA PREVENCIÓN DE
OLIGOHIDRAMNIOS: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA**

Eliz Regina Martins Lossavaro

Samira Lecoque Ribeiro

Pedro Juan Caballero – Paraguay

Año 2024

**La importancia del prenatal para la prevención de oligohidramnios:
revisión bibliográfica¹**

The importance of prenatal for the prevention of oligohydramnios: literature review.

Eliz Regina Martins Lossavaro ², Samira Lecoque Ribeiro ³, Marcia Elizabeth Morán
Vargas⁴

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay,
Pedro Juan Caballero, Amambay, Paraguay

Resumen

El diagnóstico temprano y preciso del oligohidramnios es crucial debido a su estrecha relación con complicaciones perinatales que pueden poner en riesgo la salud del feto, llegando a aumentar la mortalidad perinatal en más de diez veces. Para mejorar la detección temprana de oligohidramnios, investigadores han llevado a cabo estudios, como ecografías. Teniendo en cuenta los riesgos y la gravedad que el oligohidramnios representa para la gestante y el recién nacido, demostrando que la historia obstétrica de la paciente sirve de apoyo para el control prenatal a través de la atención médica, y las estrategias de atención posteriores para prevenir resultados negativos en el perinato, y culminar con la mejor conducta para el parto y el bienestar fetal. De esta manera, la metodología utilizada en este estudio fue una revisión bibliográfica utilizando fuentes secundarias. El rol fundamental del control prenatal es monitorear el bienestar materno-fetal, a fin de observar el desarrollo gestacional para un mejor

comportamiento pronóstico en eventualidades como el oligohidramnios. El objetivo final es el bienestar materno y fetal, ya que la vía del parto dependerá de la monitorización materna en cada caso, la edad gestacional, los signos de hipoxia en la cardiotocografía, los antecedentes obstétricos previos junto con los factores de riesgo para igualar las condiciones cervicales para un parto normal. A partir de entonces, se establecerá un plan de cuidados e intervención para las pacientes diagnosticadas de oligohidramnios, que han llevado a mejorar la atención de las mujeres en estos casos.

Palabras clave: oligohidramnios, prenatal de riesgo, factores perinatales, índice de líquido amniótico, ultrasonografía.