



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

MEDICINA

**“LA PREVALENCIA Y INCIDENCIA DEL HPV EN UNA POBLACIÓN RURAL DE
ACUÑA DE FIGUEROA, DE LA CIUDAD ALTOS, CORDILLERA”**

ADRIANA DE SOUZA PRADO

MARCIA EUGENIA MORAIS DOS SANTOS

VIRGINIA RIBEIRO MAGALHÃES

TUTOR

JOAO ITALO FORTALEZA DE MELO

Pedro Juan Caballero – Paraguay

Año 2022

1. RESUMEN

El virus del papiloma humano (VPH) que se transmite sexualmente a mujeres y hombres puede causar lesiones de alto a bajo riesgo. El cáncer cervical es la enfermedad con mayor prevalencia relacionada con ese virus. Las pruebas ginecológicas que se realizan periódicamente son necesarias para un diagnóstico preventivo y de mayor tiempo para el tratamiento de un posible cáncer, ya que el cáncer cervical es silencioso. La aparición de verrugas genitales también se observa en las infecciones por VPH, pero están relacionadas con un bajo riesgo con un tratamiento relativamente fácil. El objetivo fue evaluar la prevalencia del VPH en una población rural de La Acuña de Figueroa, Región de los Altos, Cordillera, Paraguay. Se evaluaron 14 mujeres de 26 y 57 años, ya en actividad sexual. Se observó una incidencia por VPH del 0,7% en dos mujeres de 26 y 30 años, lo que confirma que se trata de un grupo de edad con un mayor número de infecciones por VPH. La realización de pruebas de prevención con el ginecólogo es extremadamente importante para el diagnóstico prevenido y el tratamiento posterior de la enfermedad. La vacunación contra el VPH también debe ser una opción para reducir los casos de cáncer de cuello uterino en Paraguay.

Palabras clave: HPV, Epidemiología, Salud Pública