



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL PARAGUAY – UCP

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

CARRERA DE MEDICINA

**“MANEJO CLINICO DE LA ICTERICIA NEONATAL EN EL
HOSPITAL DISTRITAL DE SAN ESTANISLAO EN EL AÑO 2022”**

Trabajo de Grado Final para optar por el título de Médico.

AUTORES

João Pedro Hoffman Magnago Bueno

Diogo Martins Rodrigues

TUTOR

Arasay Quintana Hernández

Pedro Juan Caballero – Paraguay

Año 2023

1. Resumen

La ictericia neonatal se define como la coloración amarilla de la piel y mucosas, causadas por niveles anormales de bilirrubina sérica por encima de 5mg/dl. Con frecuencia está presente en dos tipos, fisiológicos es recién nacidos entre el segundo y cuarto día, patológico cuando se presenta antes de las 24 horas. Siendo de gran importancia un manejo adecuado para evitar su complicación más grave, kernicterus, que causa daño cerebral irreversible. Determinar el resultado del tratamiento propuesto para pacientes con ictericia neonatal durante el periodo de febrero y agosto de 2022. Para la realización del presente trabajo nos basamos en un estudio de tipo investigativa descriptiva, retrospectiva y transversal buscando determinar la prevalencia, factores de riesgos, tratamiento y gravedad en los casos de ictericia neonatal por medio de estudios de los registros e historias clínicas que constan en la base de datos del departamento estadístico del Hospital Regional de San Estanislao. La fototerapia fue el procedimiento mas utilizadi en 25 pacientes con valores de bilirrubina indirecta superiores a 15 mg/dl que recibieron fototerapia durante 1 día con una reducción de aproximadamente el 40% en los niveles de bilirrubina indirecta.

Palabras clave: Ictericia, hiperbilirrubinemia, San Estanislao, fototerapia, trabajo final de grado.