



Manejo clínico y farmacológico de la transmisión vertical de VIH : reporte de caso en el hospital Distrital de Limpio

Autor Arthur Macedo Souza

Daniel Mota Oliveira

Maryeli Paalissari do Valle

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero

20 de agosto de 2024

Trabajo Final de Grado



Resumen

El objetivo de este proyecto es identificar el manejo clínico y farmacológico del recién nacido madre VIH+ en la maternidad del Hospital Distrital de Limpio . Analizaremos el manejo inmediato del recién nacido (RN) en la sala de recepción , incluyendo la administración de profilaxis antirretroviral con Zidovudina oral (AZT), los cuidados en la unidad neonatal como el baño inmediato y la realización de pruebas diagnosticadas . Sera discutido la importancia de la lactancia materna segura y otras consideraciones para promover la salud del neonato. Desde la publicación del protocolo ACTG 076 en 1994 que demostró una reducción significativa en la transmisión vertical (TV)del VIH mediante el uso de zidovudina(AZT) durante el embarazo, se han implementado diversas recomendaciones para reducir esta via de transmisión . Estas incluyen el uso de terapias antirretroviral altamente efectiva (TARGA) , las abstención de la lactancia materna y la realización de cesáreas electivas . Aunque teóricamente es posible reducir la tasa de TV a niveles casi nulos, esto requiere la implementación efectiva de programas de detección y tratamiento durante el embarazo o el parto . La mayoría de los niños infectados adquieren el VIH por transmisión vertical , con tasa particularmente altas en países subdesarrollados . Los estudios en niños infectados han permitido identificar dos formas de progresion de la enfermedad que varian en rapidez y gravedad de los síntomas . La velocidad de progresión de la infección hacia el SIDA esta influenciada por multiples factores , incluyendo el momento y la via de transmisión , el estado inmunologico materno y del recién nacido , asi como factores genéticos y virales .Por ultimo , este reporte de caso clínico estructurado es producir conocimientos en educación medica continua para un camino de atención mas asertivo y constructivo a través de un eje de salud

materno-fetal, y con eso , buscar reducir el riesgo de síndrome de inmunodeficiencia adquirida congénita y la incidencia de transmision vertical del virus en la comunidad de limpio

Palabra Clave: VIH , Transmision vertical, Atencion neonatal