



Manejo Clínico y Quirúrgico en la Obstrucción Intestinal por Bidas Posquirúrgicas

Anna Caroline Oliveira Da Silva, João Henrique Freitas David Silva e Lariza Faria Silva

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero

Tutoría: Dr. Marcos Sebastião Rigonato da Silva

02 de febrero de 2024

Trabajo Final de Grado

Resumen

La obstrucción intestinal se define como la interrupción del flujo normal de contenido a lo largo del tracto gastrointestinal y puede originarse por diversas causas, como bloqueos físicos, deterioro de la circulación sanguínea o disfunción motora. Existen múltiples factores desencadenantes, siendo las bridas o adherencias, las hernias y los cánceres las causas más frecuentes. Las bridas intraabdominales, también se llama adherencias, surgen después de procedimientos quirúrgicos abdominales como parte de los procesos de curación normales que ocurren después de una lesión en el peritoneo. Son la principal causa de obstrucción del intestino delgado después de la cirugía abdominal. Un diagnóstico preciso resulta esencial y se basa en la realización de pruebas de imagen, análisis de laboratorio y una minuciosa evaluación clínica. La elección entre un enfoque terapéutico conservador y una intervención quirúrgica dependerá de la gravedad de la obstrucción y su causa subyacente. Sin embargo, en situaciones más críticas, las complicaciones pueden impactar significativamente en la calidad de vida de los

pacientes, lo que subraya la importancia fundamental de un diagnóstico preciso y un manejo adecuado. El estudio tiene como objetivo examinar los enfoques terapéuticos, tanto clínicos como quirúrgicos, empleados en el manejo de la obstrucción debido a una de las causas principales, que son las bridas intestinales y su repercusión en los resultados clínicos y la calidad de vida de los pacientes.

Palabras clave: Obstrucción, Bridas, Clínico, Quirúrgico, Manejo.