

Licenciatura en Psicología Clínica

***“Niveles de ansiedad y depresión en pacientes renales
hemodializados del Hospital Nacional de Itauguá, 2020”***

Romina Andrea Fleitas Díez Pérez.

**Asunción, Paraguay
2021**

ÍNDICE

RESUMEN	7
INTRODUCCIÓN.....	8
CAPÍTULO I	10
Planteamiento del problema	10
Objetivos de la investigación.....	14
Justificación.....	14
Limitaciones.....	16
CAPÍTULO II.....	17
Marco teórico.....	17
Insuficiencia renal crónica	17
Los tipos de tratamiento para la enfermedad renal	18
Consecuencias psicológicas de la enfermedad renal.....	20
Ansiedad.....	21
Causas de la Ansiedad.....	22
Síntomas.....	23
Dimensiones de la Ansiedad	25
Tipos de Ansiedad.....	26
Tratamientos.....	29
Depresión	29
Causas de la Depresión	30
Síntomas.....	32
Dimensiones de la depresión.....	32
Tipos de depresión	33
Tratamientos.....	35
CAPÍTULO III.....	36
Diseño metodológico	36
Variables de investigación	36
Definición conceptual	36
Definición Operacional	36
Tipo de estudio.....	37
Población y Muestra.....	38
Procedimientos para la recolección de la información.....	40
Plan de análisis.....	41
Implicaciones éticas	42
Presentación y análisis de resultados.....	43
Análisis sociodemográficos de los participantes.....	43
Análisis de ansiedad.....	47
Análisis de depresión.	49
Análisis entre los niveles de ansiedad y depresión según el tiempo de tratamiento.	51
Conclusión	53
Recomendaciones	58
Referencias bibliográficas	60
Anexo.....	64

RESUMEN

El propósito de esta investigación fue determinar el nivel de ansiedad y depresión que presentan los pacientes renales del área de hemodiálisis del Hospital Nacional de Itauguá. La muestra estuvo compuesta por 62 pacientes, hombres y mujeres mayores de 18 años en tratamiento. Se utilizó un diseño no experimental, de campo con enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo. El instrumento aplicado fue el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) y el Inventario de Depresión de Beck (BDI). Los resultados que se obtuvieron fueron que el nivel de ansiedad predominante es severo 68% y el nivel de depresión predominante es no depresión con un 37% y 31% con moderada. Existe una alta prevalencia de ansiedad y depresión en pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis.

Palabras claves: Insuficiencia renal, Ansiedad, Depresión, Hemodiálisis.