



Parto prematuro y su relación con Infección de vías urinarias en el Hospital

Distrital de Limpio

Luana Palácio Gomes

Eliel de Souza Batista

Erik Antonio Ferreira Rodrigues

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan

Caballero

Tutoría: Dra. Bibiana Deleón

2 de febrero de 2024

Trabajo Final de Grado

Parto prematuro y su relación con Infección de vías urinarias en el Hospital

Distrital de Limpio¹

Premature birth and its relationship with urinary tract infection at the Limpio District

Hospital

Luana Palácio Gomes

Eliel de Souza Batista

Erik Antonio Ferreira Rodrigues², Dra. Bibiana Deleón³

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay,

Pedro Juan Caballero, Amambay, Paraguay

Resumen

El parto prematuro asociado a UIV es una afectación materna que se produce antes de las 37 semanas de gestación. Si no tratamos adecuadamente la infección del tracto urinario, puede provocar un parto prematuro. Los bebés que nacen prematuramente pueden tener serios problemas de salud. La mujer embarazada que tiene una infección grave del tracto urinario puede estar transmitiendo a su bebé, esta infección en el bebé ocurre especialmente cuando la bacteria que causa la infección es el estreptococo del grupo B. lo que lleva al parto prematuro. En el hospital distrital de limpio se observó que la gran mayoría de los nacimientos prematuros se deben al alto número de embarazos con IUV, en base a esto se quiere investigar las causas, consecuencias y diagnósticos de los mismos pacientes. Con eso en mente, se espera que a través de este análisis podamos tener una visión completa del presente tema, destacando su impacto en la salud materno-fetal. A través de ello, detectar posibles estrategias de prevención y contribuir a la mejora de este porcentaje.

Palabras clave: Vías Urinarias, prematuridad.

