



**Percepcion sobre barreras para la realización del Papanicolau en pacientes atendidas
en el Hospital Regional de San Pedro del Ycuamandyju**

Autor Debora Alanna De Brito Saraiva

Maria Gabriela de Oliveira Lacerda

Roney Lourenço Camargo

**Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan
Caballero**

29E de enero de 2025

Trabajo Final de Grado



Resumen

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la percepción y las barreras para la realización del examen de Papanicolau entre las pacientes atendidas en el Hospital Regional de San Pedro de Ycuamandyju. Se trató de una investigación descriptiva, de corte transversal, realizada con una muestra de 100 mujeres de 17 a 68 años seleccionados mediante un muestreo por conveniencia. Las variables principales incluyeron la adherencia al examen de Papanicolau, factores sociodemográficos (edad, nivel educativo, lugar de residencia), conocimiento sobre el examen y barreras percibidas. Los datos fueron recolectados a través de un cuestionario estructurado administrado presencialmente y procesados en una hoja de cálculo para análisis estadístico. Los resultados mostraron que el 77% de las participantes se había realizado el examen al menos una vez, pero solo un 40% cumplió con la periodicidad recomendada. Las principales barreras reportadas fueron la vergüenza (25%), la falta de tiempo (12%) y el miedo al dolor o incomodidad (8%). Se identificó una mayor adherencia al examen entre mujeres con nivel educativo superior y residentes en áreas urbanas, mientras que las participantes de zonas rurales y con bajo nivel educativo presentaron menor frecuencia de realización. El conocimiento adecuado sobre el examen se asoció significativamente con su adherencia, destacando la importancia de estrategias educativas para ampliar la cobertura. Se concluyó que las barreras individuales y estructurales limitan el acceso al Papanicolau, lo que subraya la necesidad de políticas públicas integradas que consideren las disparidades.

socioeconómicas y geográficas para garantizar la equidad en la prevención del Cancer de cuello uterino

Palabra Clave: Examen de Papanicolau, Cancer de cuello uterino, Salud publica, Prevencion primaria, Barreras de acceso