



**PERFIL CLÍNICO Y SOCIODEMOGRÁFICO DE LAS PACIENTES ATENDIDAS EN LA
URGENCIA OBSTÉTRICA DEL HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY EN EL
AÑO 2025**

Beatriz Ferreira Barbosa,
Debora Silva Alves Ferreira
Josilene Dias Cardoso

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero.

Tutoria: Dra. Bibiana Deleon

26 de Agosto de 2025

Trabajo Final de Grado

**PERFIL CLÍNICO Y SOCIODEMOGRÁFICO DE LAS PACIENTES ATENDIDAS EN LA
URGENCIA OBSTÉTRICA DEL HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY EN EL
AÑO 2025**

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay,

Pedro Juan Caballero, Amambay, Paraguay.

Resumen

Las urgencias obstétricas constituyen un desafío relevante para los sistemas de salud, especialmente en contextos rurales donde el acceso oportuno a la atención materna es limitado. El objetivo de este estudio fue caracterizar el perfil clínico y sociodemográfico de las pacientes que acudieron a la urgencia obstétrica del Hospital de Santa Rosa del Aguaray durante el año 2025. Se realizó un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo mediante revisión de registros médicos, incluyendo a 375 pacientes atendidas en el servicio de urgencias obstétricas. Se analizaron variables demográficas, antecedentes obstétricos, motivos de consulta, diagnósticos clínicos y manejo terapéutico. Los resultados mostraron que la edad promedio fue 26.8 años, con predominio del grupo entre 18-25 años (39.4%). La mayoría tenía educación primaria (42.1%), residía en localidades rurales alejadas (el 24.4% a más de 200 km) y no contaba con cobertura de seguridad social (85.6%). En cuanto a ocupación, el 79.2% no realizaba trabajo remunerado. El motivo principal de consulta fue el trabajo de parto (66.1%), seguido de dolor abdominal/pélvico (93.9%) y contracciones uterinas (79.9%). Predominaron pacientes primigestas (24.6%), sin antecedentes de cesáreas previas (94.1%). La rotura prematura de membranas fue el diagnóstico más frecuente (6.7%), seguida de infección urinaria (5.9%) y oligohidramnios (4.5%). El 54.7% requirió internación, el 24.4% recibió inducción del parto y el 12.9% cesárea. La resolución del embarazo fue por parto vaginal en el 54.5% y por cesárea en el 36.2%. Se concluye que las pacientes atendidas presentan un perfil clínico de bajo riesgo previo, aunque condicionado por vulnerabilidad social y geográfica, lo que favorece el acceso tardío y la consulta ante complicaciones obstétricas ya establecidas.

Palabras clave: urgencias obstétricas, perfil clínico, factores sociodemográficos, atención materna, Paraguay