



**PREVALENCIA DE LA NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN NIÑOS DE 2 A 6
AÑOS: UN ESTUDIO OBSERVACIONAL EN EL HOSPITAL DISTRITAL DE YBYCÚÍ DE
AGOSTO DE 2024 HASTA ENERO DE 2025**

Izaque Vilhalva Peralta Junior

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero.

Tutoria: Dra. Mónica Cristina Gonzalez Vásquez

26 de Agosto de 2025

Trabajo Final de Grado

PREVALENCIA DE LA NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN NIÑOS DE 2 A 6 AÑOS: UN ESTUDIO OBSERVACIONAL EN EL HOSPITAL DISTRITAL DE YBYCUÍ DE AGOSTO DE 2024 HASTA ENERO DE 2025

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay,

Pedro Juan Caballero, Amambay, Paraguay.

Resumen

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) continúa siendo un problema prioritario de salud pública infantil en países de ingresos bajos y medios, especialmente en zonas rurales. Este estudio tuvo como objetivo identificar la prevalencia de NAC en niños de 2 a 6 años atendidos en el Hospital Distrital de Ybycui, Paraguay, entre agosto de 2024 y enero de 2025, así como analizar sus principales factores de riesgo y el manejo clínico de los casos. Se trató de una investigación observacional descriptiva, retrospectiva y de enfoque cuantitativo. La muestra fue no probabilística, compuesta por niños con diagnóstico confirmado de NAC, conforme a los criterios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Se analizaron variables sociodemográficas, clínicas, ambientales y de acceso a servicios de salud, a partir de registros médicos hospitalarios. Se halló una prevalencia de 10.8% de NAC entre los ingresos pediátricos, siendo mayoritariamente en varones de 2 a 3 años, con residencia rural, exposición a humo de leña y quema de residuos, y acceso geográfico limitado a servicios sanitarios. Un tercio de los pacientes presentó signos de desnutrición leve. El tratamiento fue eficaz en la mayoría de los casos, aunque algunos requirieron derivación a centros de mayor complejidad. Se concluyó que la NAC en esta población está fuertemente asociada a determinantes sociales y ambientales, como la pobreza energética, la contaminación intradomiciliaria y las barreras geográficas. Los resultados destacan la necesidad de fortalecer la atención primaria, mejorar la infraestructura sanitaria local y desarrollar intervenciones comunitarias orientadas a la prevención, diagnóstico oportuno y educación en salud. Este estudio contribuyó con evidencia local relevante que puede orientar políticas públicas integrales para la reducción de la morbilidad infantil por enfermedades respiratorias prevenibles.

Palabras clave: Neumonía adquirida en la comunidad; Salud infantil: Determinantes sociales de la salud.