



Prevalencia de la Neumonía adquirida en la comunidad en pacientes adultos mayores internados en el hospital General de Luque-Paraguay en el año 2024

Autor Maiara Fernandes da Silva

Maria Izabel de Souza Menezes

Willian Wallace Oliveira Sousa

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero

29 de enero de 2025

Trabajo Final de Grado



Resumen

La neumonía adquirida en la comunidad constituye una de las primeras entidades dentro de las infecciones respiratorias agudas causante de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. El objetivo principal del estudio fue determinar la prevalencia de la Neumonía adquirida en la comunidad según: edad, Sexo, antecedentes de neumonía, comorbilidades asociadas y tratamiento instaurado en adultos mayores. La población estudiada estuvo constituida por 100 pacientes adultos mayores, de ambos sexos internados en Clínica Medica del Hospital General de Luque -Paraguay durante el periodo de enero a diciembre de 2024. La metodología empleada fue un estudio observacional descriptivo de corte transversal, de diseño experimental y de tipo cuantitativo sobre una población enfocada en la región mencionada. Las variables medidas fueron edad, sexo, antecedentes de neumonía, comorbilidades asociadas y tratamiento instaurado. Los resultados mostraron que la incidencia de neumonía atípica fue del 52 %, con mas frecuencia en adultos mayores con edades de 56 a 60 años, y mayormente en el sexo femenino (52%). El 54% presentaron antecedentes de neumonía. El 21 % de los pacientes presentaron cardiopatías y el 15 % hipertensión arterial como comorbilidades asociadas. El tratamiento aplicado fue la antibioterapia en el 53% de los casos. Se concluyo que la neumonía adquirida en la comunidad afecta mas al sexo femenino, a adultos de 56 a 60 años de edad, que presentaron antecedentes de neumonía y cardiopatías.

Palabra clave: Neumonía, Neumonía adquirida en la comunidad, Factores de riesgo, Adulto