



Prevalencia de Preeclampsia en mujeres gestantes que acudieron al servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital regional de Concepcion en el primer semestre del año 2024

Autor Lais Jokacia Campos Costa

Naitiele Daniela Ferreira Vicente

Rimendes Sebastião Cardoso

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero

20 de agosto de 2024

Trabajo Final de Grado



Resumen

El trastorno hipertensivo multisistémico exclusivo del ser humano complica aproximadamente el 10 % de todos los embarazos con la incidencia mayor en los países en desarrollo constituye una de las principales causas de muerte materna obstétrica y es responsable de una alta morbi-mortalidad fetal. Se considera importante determinar la prevalencia de preeclampsia en mujeres gestantes que acuden al servicio de gineco-obstetricia del Hospital Regional de Concepción en el primer semestre del año 2024 y conocer los principales factores que inciden en esta patología para poder identificar con mayor facilidad a los grupos de mujeres de mayor riesgo respecto a esta problemática de salud y así tomar las medidas necesarias. Por tal motivo, el presente trabajo tuvo como objetivo principal determinar la prevalencia de preeclampsia en mujeres gestantes que acudieron al servicio de gineco-obstetricia del Hospital Regional de Concepción -Paraguay en primer semestre del año 2024. Para ello se analizaron las características sociodemográficas, los factores de riesgo de las gestantes como también sus características gineco obstétricas. Los datos obtenidos permitieron deducir que los factores que constituyen un riesgo para el desarrollo de preeclampsia en gestantes son ser primigesta, menor de 25 años de edad y proceder de zona urbana. El riesgo fue mayor en mujeres jóvenes con antecedentes personales y familiares de HTA anterior.

Palabra Clave: Preeclampsia, Embarazo, Hipertensión Arterial