



**Prevalencia y factores asociados a complicaciones post hernioplastia inguinal
en el Hospital Regional de Paraguari.**

Jessica Ribeiro Rangel, Lucas Martins de Lima, Wagno Araujo de Resende.
Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan
Caballero

Tutoría: Dr. Marcos Sebastião Rigonato da

Silva 12 de julio de 2023

Trabajo Final de Grado

Prevalencia y factores asociados a complicaciones post hernioplastia inguinal en el Hospital Regional de Paraguarí.

Prevalencia y factores asociados a complicaciones post hernioplastia inguinal en pacientes atendidos en el Hospital Regional de Paraguarí de enero a junio de 2023.

Jessica Ribeiro Rangel, Lucas Martins de Lima, Wagno Araujo de Resende.

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay,

Pedro Juan Caballero, Amambay, Paraguay

Resumen

Este artículo analiza la prevalencia y los factores asociados a las complicaciones posteriores a la hernioplastia inguinal en pacientes atendidos en el Hospital Regional de Paraguarí durante el período de enero a junio de 2023, a través de una revisión minuciosa de 22 prontuarios médicos. La hernioplastia inguinal es un procedimiento quirúrgico común utilizado para reparar una hernia inguinal. Sin embargo, puede haber complicaciones después de la cirugía, lo que afecta la calidad de vida de los pacientes. Por tal razón se realizó el presente trabajo de investigación, con el objetivo de determinar la prevalencia y factores asociados a complicaciones post hernioplastia inguinal en los pacientes atendidos en el Hospital Regional de Paraguarí en el año 2023. Se analizaron 22 pacientes, cuya media de edad fue de 51 años. El rango de edad fue de 20 años con un límite inferior de 21 y un límite superior de 75. Los datos permitieron concluir que la prevalencia de complicaciones post hernioplastia inguinal está asociada a grupos de pacientes que tienen factores de riesgo como: pertenecer al sexo masculino y ser mayores de 60 años, independientemente del estado nutricional. La técnica quirúrgica que presenta mayor tasa de complicaciones es la técnica abierta de Liechtenstein con un tiempo quirúrgico mayor a 70 minutos. las hernias primarias presento mayor tasa de complicación según su origen y las hernias inguinales izquierdas según su sitio anatómico. Sendo así mesmo con estos resultados significativos, sugerimos realizar investigaciones futuras con muestras más grandes y en varios centros, así como considerar otros factores

Palabras clave: Hernia, Hernioplastia, Complicaciones.