



Prevalencia y principales indicaciones de cesarea en gestantes atendidos en el servicio de gineco-obstetricia del Hospital Regional de Concepcion en primer semestre del año 2024

Autor Fernanda Filgueiras Almeida Pedreira

Sandra Gabrieli Andrade Velázquez

Marcelo Barbieri

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero

29 de enero de 2025

Trabajo Final de Grado



Resumen

El procedimiento medico quirurgico cesarea fue incorporado a la practica medica obstétrica con el fin de solucionar aquellos problemas que pudieran significar muerte para la madre y/o el niño . Su frecuencia se ha acrecentado a tal punto que actualmente lo que apareció como una solucion , ahora se vislumbra como un problema por su excesiva liberación . Se realizo un estudio observacional , descriptivo , de corte transversal con muestreo probabilistico aleatorio simple con el objetivo de determinar la prevalencia y principales indicaciones de cesarea en las gestantes asistidas en el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Regional de Concepcion durante el primer semestre del año 2024 en el cual se analizo a 1010 gestantes asistidas en el servicio de Ginecologia y Obstetricia del Hospital Regional de Concepcion , de las cuales 31%(n=310) correspondieron a los nacimientos que culminaron por parto cesarea , determinándose de esta manera la prevalencia de la misma. Los resultados obtenidos fueron que la mayoría de los casos corresponden a mujeres de 18 a 35 años , en unión libre , de nivel secundario de educación , de procedencia urbana y con trabajos no profesionales. Las principales indicaciones de cesáreas de dieron por causas fetales , donde las alteraciones de la situación , presentación o actitud fetal fueron la mas determinantes. Las principales causas maternas de indicación de cesáreas fueron los antecedentes de cesáreas anteriores y en segundo lugar , el sufrimeinto fetal y la principal causa mixta de indicación de cesáreas fue la pre eclampsia/eclampsia

Palabra clave: Cesárea, Prevalencia, Indicaciones