



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL PARAGUAY – UCP

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

CARRERA DE MEDICINA

“Relación entre parto vaginal e indicaciones de cesárea”

Trabajo de Grado Final para optar por el título de Médico.

AUTORES

**Adriana Rezende de Oliveira
Elienai Policeno Krummeanuer**

TUTOR

Dr. Carlos Alberto Soroa Izaguirre

Pedro Juan Caballero – Paraguay

Año 2022

1. Resumen

El estudio fue descriptivo, retrospectivo, documental, a partir de las informaciones de prontuarios. El lugar de la recolección de los datos fue el Hospital Regional de San Pedro de Ycuamandyyú, Paraguay. La población elegida para el estudio fue de gestantes a partir de 15 años, en el periodo de enero a junio del 2022, totalizando 309 pacientes atendidas en el servicio de salud mencionado. Fueron registrados 133 cesáreas, que corresponden al 43,05% de todos los partos hechos en el Servicio de Obstetricia del Hospital Regional de San Pedro de Ycuamandyyú. Resultados: A pesar de los justificados beneficios de realizar parto vaginal tanto para la madre como para el bebé, aun así, el nro de cesárea es muy elevado teniendo en cuenta la tasa aceptada por la OMS. Fueron registrados 133 cesáreas que corresponden al 43,05% de los partos y 176 partos vaginales 56,95%. Las cesáreas fueron mas prevalentes en el grupo etario de 21 a 30 años, representando el 35,3% del total. Entre las indicaciones de la operación cesárea hechas por que la madre o el feto estaban en riesgo, se observó que 22,6% fueran por cesárea anterior. Conclusión: El índice de partos por cesárea fue elevado en el Hospital investigado (43,05%), cuando la OMS establece un índice deseado de 10 a 15 %. Las indicaciones mas frecuentes de cesárea encontradas en este estudio fueron cesárea anterior, presentación podálica y otras.

Palabras clave: Cesárea, obstetricia, riesgo, gestantes.