



**RELATO DE CASO DE CORIOCARCINOMA UTERINO SECUNDARIO A MOLA
HIDATIFORME**

Ana Caroline Pereira Lacerda

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero.

Tutoria: Dra. Ana Lucia Pereira da Silva Schiave

26 de Agosto de 2025

Trabajo Final de Grado

RELATO DE CASO DE CORIOCARCINOMA UTERINO SECUNDARIO A MOLA HIDATIFORME

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay,

Pedro Juan Caballero, Amambay, Paraguay.

Resumen

La enfermedad trofoblástica maligna se caracteriza por la proliferación anómala de células en la capa muscular del útero, proceso que puede recibir distintas denominaciones, siendo una de ellas el coriocarcinoma. Este tipo de crecimiento celular anormal puede desarrollarse tanto durante el embarazo como en el periodo posterior. El proceso patológico se origina a partir de células germinales embrionarias, lo que provoca una multiplicación acelerada y la formación de una masa intrauterina con apariencia tumoral, frecuentemente acompañada de síntomas como dolor y hemorragias uterinas. El presente estudio relata el caso clínico de una mujer de 36 años, con historia de embarazo molar diagnosticado un año antes, quien acudió al servicio médico por presentar sangrado genital abundante y prueba positiva de gonadotrofina corionica humana (B-HCG). Tras la evaluación mediante estudios por imágenes, se identificaron signos compatibles con infiltración celular en la cavidad uterina. En consecuencia, se optó por la realización de una histerectomía total como medida terapéutica, y el material quirúrgico fue remitido a análisis anatomopatológico, el cual confirmó la presencia de coriocarcinoma. Este trabajo tiene como objetivo presentar dicho caso, destacando el cuadro clínico, métodos diagnósticos utilizados y las estrategias de tratamiento aplicadas

Palabra Clave: Enfermedad trofoblástica, Coriocarcinoma maligno, Histerectomía, Reporte de Caso