



Reporte de caso de imperforacion himenal asociada com hematocolpos em uma adolescente de 14 años : Abordaje diagnóstico tratamiento

Autor Amanda Caroline de Oliveira Rios

Bruna Rodrigues de Andrade

Simone Camila Cardoso Amaral

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero

29 de enero de 2025

Trabajo Final de Grado



Resumen

La imperforación himenal suele ser el resultado de un defecto en la canalización de la placa vaginal durante el desarrollo fetal, y su incidencia oscila entre el 0.1% y el 0.5% . Aunque es poco frecuente , la asociación del himen imperforado con la menstruación retrograda es una causa de dilatación de la vagina y el útero. Los signos y síntomas mas comunes son : menarquia tardía , dolor cíclico en los cuadrantes inferiores del abdomen , dolor persistente en la región lumbosacra, aparición de hinchazón abdominal inferior y molestias urinarias. Objetivo: Destacar la importancia de la recopilación de una historia clínica y un examen físico cuidadoso , que son indispensables para el diagnóstico del hematocolpos por himen imperforado , ya que es una patología cuyo diagnóstico es esencialmente clínico. Material y Método : Caso clínico de una adolescente de 14 años , atendida en el servicio de urgencia ginecológicas , con dolor abdominal recurrente, ausencia de menarquia y presencia de caracteres sexuales secundarios (estadio Tanner M3P3) Tras el diagnóstico de himen imperforado asociado a hematocolpos (confirmado por ecografía) se le realizó himenectomía, con drenaje de abundante contenido sanguíneo y resolución del cuadro clínico. La paciente fue dada de alta y se encuentra en seguimiento ambulatorio sin alteraciones ginecológicas y con desarrollo puberal normal

Palabra clave: Amenorrea, Himen, Imperforado, Hematocolpo, Menarca