



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL PARAGUAY – UCP

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

CARRERA DE MEDICINA

“SEPSIS NEONATAL”

Trabajo de Grado Final para optar por el título de Médico.

AUTORES

Natalia Fidelis Batista

TUTOR

Dra. Talita Miyamoto

Pedro Juan Caballero – Paraguay

Año 2022

1. Resumen

Este estudio buscó analizar los principales factores de riesgo y prevención para el desarrollo de sepsis neonatal temprana. El estudio es una revisión de la literatura y se incluyeron en la búsqueda 20 artículos de la plataforma no PubMed e la Scxielo e 3 libros con los descriptores: sepsis neonatal, infección, factores de riesgo y prevención. O objetivo de este trabajo presentar los principales factores de riesgo en sepsis neonatal temprana, diagnósticos, tratamientos y prevención temprana.

La sepsis neonatal temprana es causada principalmente por la infección del tracto genital materno por el Estreptococo tipo B, parto prematuro, ruptura prematura de las membranas, ruptura de membranas mas de 18 horas antes del parto.

Prematuridad, la el bajo pesos al nacer y la asfixia perinatal son factores de riesgo para los recién nacidos, factores de riesgo documentos para sepsis neonatal, los cuales se pueden agrupar en factores maternos, neonatales o ambientales.

La infección por GBS ha disminuido drásticamente en los últimos 15 años con la implementación de la profilaxis antibiótica. Intraparto, con el uso de penicilina G o ampicilina, por vía intravenosa (IV), en mujeres embarazadas con cultivo positivo para GBS en el embarazo o con resultados de cultivo desconocidos.

Conclusiones: Se concluye que la sepsis neonatal es una condición resultante de la interacción de múltiples factores de riesgo, tanto maternos como fetales, y es de suma importancia reconocerlos para prevenir el desarrollo.