



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL PARAGUAY - UCP
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA DE MEDICINA

**“VIRUS DEL PAPIPOLMA HUMANO (VPH) Y SUS FACTORES DE
RIESGO PARA EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO.”**

Trabajo de Grado Final para obtener el título de Médico.

AUTORES

Rafaela Torres Campos
Vera Lucia Avelino Soares

TUTOR

Dra Talita Miyamoto

Pedro Juan Caballero – Paraguay

Año 2022

1. RESUMEN

El autor presenta como objetivo la relación entre el Virus del Papiloma Humano (VPH), con cáncer de cuello uterino. Introducción: El VPH es un virus de transmisión sexual y la mayoría infecciones es asintomática o inaparente y transitoria. Las formas de presentación son clínicas (lesiones exofíticas o verrugas) y subclínico (sin lesión aparente). Problemática: El VPH es un problema de salud pública, con eso los factores que determinar la persistencia de la infección y su progresión a neoplasia intraepitelial cervical (CIN) (displasia moderada, displasia severa o carcinoma in situ) son los tipos virales presentes y cofactores, entre ellos, el estado inmunológico y el tabaquismo, los tipos 6 y 11 suelen encontrarse en verrugas benignas (condiloma acuminado), que, aunque representan una proliferación anormal del epitelio, rara vez muestran evidencia de transformación maligna. Metodología: se trata de un estudio integrador de revisión bibliográfica, en las bases de datos bibliográficas de Literatura Latinoamericana del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS), SCIELO, Sistema de Análisis y Recuperación de Literatura Médica en Línea (MEDLINE/PUBMED) realizado en marzo y abril de 2022. Conclusión: En alrededor del 90% de los casos, el cáncer de cuello uterino invasivo evoluciona a partir de CIN, sin embargo, no todas las NIC progresan a un proceso no autorizado. Todas las NIC deben ser consideradas lesiones significativas y como tales deben ser tratadas.

Palabras clave: VPH, cáncer cervicouterino, vacuna, NIC, CIN.