



**VITILIGO DE INICIO TEMPRANO EN UNA PACIENTE PEDIÁTRICA DE 3 AÑOS:
REPORTE DE CASO**

**Cléia Regina Teodoro de Souza,
Patricia Lorena Rolón Silva**

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero.

Tutoria: Dr. Geovani Fabian Meireles Duarte

26 de Agosto de 2025

Trabajo Final de Grado

VITILIGO DE INICIO TEMPRANO EN UNA PACIENTE PEDIÁTRICA DE 3 AÑOS: REPORTE DE CASO

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Central del Paraguay,

Pedro Juan Caballero, Amambay, Paraguay.

Resumen

El vitiligo es un trastorno cutáneo adquirido de causa autoinmune, caracterizado por la pérdida progresiva de melanocitos, lo que produce máculas acrómicas bien delimitadas. El objetivo general de este trabajo fue reportar un caso de vitiligo de inicio temprano en una paciente pediátrica de 3 años, diagnosticado en la Clínica del Niño de Pedro Juan Caballero. Paraguay, en el año 2023. Se trató de un estudio observacional de tipo descriptivo, basado en un informe de caso clínico. La recolección de datos se realizó a partir de la historia clínica de la paciente, el examen físico, estudios complementarios y seguimiento terapéutico durante un periodo de tres meses. Se documentaron variables clínicas como localización y extensión de las lesiones, evolución, respuesta al tratamiento, estudios de laboratorio y uso de herramientas diagnósticas como la lámpara de Wood. Las lesiones despigmentadas aparecieron inicialmente en la región periorbitaria y posteriormente se extendieron a extremidades inferiores y abdomen, sin síntomas asociados ni antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes. El examen con lámpara de Wood confirmó la despigmentación, y los estudios tiroideos resultaron normales. Se inició tratamiento con betametasona oral, pimecrolimus tópico y melangenina plus, junto con fotoprotección estricta. A los tres meses, se observó una repigmentación aproximada del 40% en las lesiones faciales, mientras que las lesiones en miembros inferiores se mantuvieron estables, sin progresión. Se concluyó que el abordaje temprano y combinado permitió estabilizar el cuadro y promover la repigmentación parcial en zonas visibles, con buena tolerancia al tratamiento. El caso aportó información clínica útil sobre el comportamiento y tratamiento del vitiligo en edad pediátrica temprana en un contexto regional, destacando la importancia del diagnóstico precoz y el seguimiento multidisciplinario.

Palabras clave: Vitiligo, Niño, Inmunoterapia tópica, Fototerapia, Dermatología pediátrica